

# Colchicine 秋水仙素

商品名: Colchicine (可樂喜定) - - - -成份: Colchicine - - 0.5 mg/錠

## ■ 藥品作用？

預防及治療急性痛風，針對痛風具有特異性的抗發炎作用。

## ■ 如何服用？若忘了服藥，該怎麼辦？

✓ 依醫師指示服用劑量，一日可分6~8次服用，隨年紀，症狀增減劑量。

◆ 預防發病時：成人一日1~2#(0.5~1mg)。

◆ 有發作之預防時：一次1#(0.5mg)口服。

✓ 若疼痛已消除，而副作用非常明顯，例如：噁心，嘔吐，腹瀉等，應立即停藥。若已達醫生指示之最大劑量仍無法止痛，亦需停藥。

✓ 痛風發作時，須併服的其他降尿酸藥及止痛藥。不宜任意停止使用。

## ■ 服藥期間，飲食該注意什麼？

1.服藥期間不宜喝酒，因酒精會增加血中尿酸值。

2.會暫時性造成VitB12的吸收不良。

3.老年人或體力衰弱者，應考慮降低劑量使用。

4.作預防使用長期投予時，可能會有血液障礙，生殖器障礙，肝腎傷害，脫毛等嚴重副作用。

若非必要，不宜長期推薦使用。

5.孕婦及授乳婦以不投予為原則。

6.宜補充大量液體(每天2500C.C)，以防腎結石。

## ■ 本類藥有副作用嗎？若出現副作用時該如何處理？

✓ **長期使用**：血便，黑便，喉嚨痛，發燒，再生不良性貧血，顆粒性白血球減少，脫毛，肌肉病變，末梢神經炎，不正常疲倦，虛弱(若有以上症狀須停藥處理並告知醫生)。

✓ **過敏症**：搔癢，發疹(應即停止投予並告知醫生)。

✓ **胃腸不適**：有時會有噁心、嘔吐、腹瀉、腹部痙攣(宜觀察，可減量或停藥處理)。

## ■ 本藥品該如何存放保存？

✓ 阻光儲存(日光直接照射會變質)。

✓ 本品應置於孩童無法觸及處，若過有效期限，勿再使用。



以上內容不代表全部用藥資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師諮詢。  
藥物諮詢專線 (07) 8036783 轉3325