



# 日本腦炎

- ① 感染日本腦炎病毒所引起的**急性腦膜腦炎**。
- ② 經由具有感染力的**病媒蚊**叮咬，人不會直接傳染給人，臺灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介。
- ③ 流行季節主要在每年**5至10月**，病例高峰通常出現在**6至7月**。
- ④ 感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現臨床症狀（最常見的是急性腦炎）。
- ⑤ 日本腦炎的**致死率約20%至30%**，存活病例中，**約30%至50%有神經性或精神性後遺症**。
- ⑥ 預防方法為接種**日本腦炎疫苗**。

## 活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗

1. 接種時程：**出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑**。
2. 經醫師評估不適合接種活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗者，地方政府衛生局（所）有提供不活化日本腦炎疫苗。
3. 成人若居住地或工作場所接近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險地區，可至**旅遊醫學門診**諮詢，評估自費接種疫苗。

## 預防病媒蚊叮咬

1. 於流行期作好自我保護措施，可穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處使用含DEET或Picaridin之防蚊藥劑。
2. 建議安裝紗門及紗窗，及使用蚊帳。
3. 避免於黎明和黃昏等病媒蚊活動的高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。

