



戰勝小兒麻痺

台灣1994年將「**急性無力肢體麻痺**」納入傳染病通報項目。這類病症特別好發於**兒童**，所以對於小兒麻痺症的監視特別重要。任何有急性無力肢體麻痺症狀（包括15歲以下Guillain-Barré症候群）；無需任何病因即可報告。

國際預防接種



成人IMOVAX® Polio單劑接種(0.5 ml) · 肌肉注射前2劑間隔4~8週，第3劑與第2劑間隔6~12個月。

兒童預防接種



幼兒應接種共4劑，於出生滿2個月、4個月、6個月各接種一劑，並於滿18個月再追加一劑。



滿5歲至入國小前再追加一劑白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV/Tdap-IPV)。

1. 小兒麻痺致病因子：**小兒麻痺病毒(poliovirus)**
2. 小兒麻痺傳染方式：主要透過**受汙染的食物、飲水傳染**，但大流行期間也會由**人與人之接觸傳染或飛沫傳染**。
3. 小兒麻痺潛伏期：3到35天，通常**7到14天**。
4. 小兒麻痺傳染窩：**人類**是唯一傳染窩。
5. 感染症狀：95%以上感染者無明顯症狀，少數會出現發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐等輕微症狀，1~2%的人出現無菌性腦膜炎，只有小於1%的人會出現**麻痺症狀**。
6. 最有效的預防方法：**按時完成常規小兒麻痺疫苗預防接種**，前往高風險國家可視情況追加接種。



高雄市立小港醫院 藥學科 關心您的健康

