



狂犬病

-Rabies-

狂犬病屬第一類法定傳染病，應於**24小時內進行通報**

- ① 狂犬病傳染方式患有狂犬病之動物咬傷，唾液中含有病毒，可經由抓、咬(或經由皮膚傷口、黏膜)而進入人體。
- ② 狂犬病病毒的分佈90%以上在野生動物(鼬鼠、浣熊、蝙蝠、狐狸)身上。
- ③ 疾病的潛伏期通常為1至3個月，短則少於7天，長則可達1年以上。

人用狂犬病疫苗及狂犬病免疫球蛋白接種對象

狂犬病疫苗	狂犬病免疫球蛋白(HRIG)										
<p>曝露(咬傷)前：暴露前疫苗共3劑於0、7、21(或28)天注射，共三劑。</p> <p>曝露(咬傷)後：暴露後疫苗共4劑，接種時程為第0天(接種第一劑當天為第0天)，及第3、7、14 施行。</p>	<p>不需給予。</p> <p>暴露等級為第三類，可與疫苗同時施打，或於首劑疫苗施打後7天內施打(非以被咬傷暴露的日期計算)，只可單劑使用。</p>										
	<table border="1"> <tr> <td>藥名</td> <td>Hyper RAB 300 IU/ml</td> </tr> <tr> <td>劑量</td> <td>20 IU/kg</td> </tr> <tr> <td>稀釋液</td> <td>以5%葡萄糖水1比1倍稀釋</td> </tr> <tr> <td>副作用</td> <td>常見(約>5%臨床試驗對象)曾發生接種部位疼痛、頭痛、注射部位結節、腹痛、腹瀉、腹脹、鼻塞與口咽疼痛。</td> </tr> <tr> <td>禁忌症</td> <td>無</td> </tr> </table>	藥名	Hyper RAB 300 IU/ml	劑量	20 IU/kg	稀釋液	以5%葡萄糖水1比1倍稀釋	副作用	常見(約>5%臨床試驗對象)曾發生接種部位疼痛、頭痛、注射部位結節、腹痛、腹瀉、腹脹、鼻塞與口咽疼痛。	禁忌症	無
藥名	Hyper RAB 300 IU/ml										
劑量	20 IU/kg										
稀釋液	以5%葡萄糖水1比1倍稀釋										
副作用	常見(約>5%臨床試驗對象)曾發生接種部位疼痛、頭痛、注射部位結節、腹痛、腹瀉、腹脹、鼻塞與口咽疼痛。										
禁忌症	無										

請遵循「1記、2沖、3送、4觀」口訣



圖片來源：衛福部疾管署



高雄市立

小港醫院 藥學科 關心您的健康

