



阿米巴性痢疾

1. 阿米巴感染症為阿米巴原蟲 (*Entamoeba histolytica*) 所引起的疾病，以**傳染者以人為主**
2. 阿米巴原蟲的感染途徑為**糞口感染**
3. 潛伏期：8-10 天至數個月，通常為**2-4 週**
4. 臨床症狀：從**輕微到慢性腹瀉**程度不等，其他常見症狀如：糞便中帶黏液及血絲、腹痛、裏急後重、間歇性下痢、噁心、嘔吐、發燒等
5. 治療：醫師在確定診斷後，會給予**殺菌劑**治療
 - ① 有症狀的感染者：metronidazole, tinidazole, dehydroemetine (阿米巴組織型藥物)治療後,因約40-60%患者腸道仍存有阿米巴原蟲,故需接著使用阿米巴殺腸腔藥物
 - ② 無症狀的感染者:iodoquinol, paromomycin, diloxanide furoate (阿米巴殺腸腔藥物)
6. 預防
 - ① 飲水需經**煮沸**後始可飲用。生食蔬菜務必清洗乾淨，於環境衛生不佳之地區，**盡量避免生食**。
 - ② 注意食物管理，避免蒼蠅、蟑螂等之污染，確保飲食衛生。



清除垃圾



飲食前洗手



飲用瓶裝水或煮沸的水



食物煮熟再吃



避免蟑螂、蒼蠅孳生



第 2 類法定傳染病 24小時內向主管機關通報

高雄市立小港醫院 藥學科 關心您的健康

