




旅遊醫學常見疾病及用藥須知

流行性腦脊髓膜炎 - Meningococcal Meningitis

- ① 流行性腦脊髓膜炎傳染方式: 直接接觸感染者的喉嚨或鼻腔分泌物、飛沫。
- ② 流行性腦脊髓膜炎傳染期: 自個案發病前10天起, 持續到適當的抗生素治療後24小時, 口鼻不再帶菌為止。
- ③ 潛伏期: 2~10天, 通常為3~4天。
- ④ 預防流行性腦脊髓膜炎最有效的方法: 腦脊髓膜炎疫苗 (不活化疫苗)。
- ⑤ 目前衛生福利部疾病管制署合約之旅遊醫學醫院接種4價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗, 可預防A, C, Y, W-135等4種血清型。



前往高風險地區旅遊者
提早**10天**施打疫苗,
保護力可維持**5年**




接種禁忌



- ① 免疫力不全患者、或正在接受免疫抑制治療者
- ② 孕婦及哺乳中婦女
- ③ 血小板低下或凝血功能異常者
- ④ 正處於高燒或急性感染症者, 宜待病情穩定後再接種

- ✓ 出現症狀儘早給予抗生素治療。
- ✓ 個案應持續呼吸道隔離至抗生素開始治療後24小時。



第2類法定傳染病 24小時內向主管機關通報

高雄市立

小港醫院

藥學科

關心您

的健康



110年8月製訂