



埃及斑蚊



白線斑蚊

登革熱

- ① 登革熱是由**登革病毒**所引起，分為 I、II、III、IV 四種血清型別，而每一型都具有能感染致病的能力。
- ② **傳染方式**：藉由病媒蚊叮咬人時將病毒傳入人體內，其病媒蚊為**埃及斑蚊** (Aedes aegypti) 及**白線斑蚊** (Aedes albopictus)。
- ③ **潛伏期**：約為3-8天，最長可達14天。
- ④ **臨床症狀**：
一般症狀：高燒、出疹、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、噁心、食慾不振
警示徵象：出血、胸水、腹水、腹痛、肝臟腫大、持續嘔吐、嗜睡、躁動不安
- ⑤ 目前無特效藥物可治療，採取**支持性療法**。
- ⑥ 目前**尚無有效可施打的疫苗**。
- ⑦ 解熱鎮痛劑以 **Acetaminophen** 較安全，避免使用 aspirin 或 NSAID，以免破壞血小板的功能。

第二類法定傳染病：24小時內通報

★預防方法

一. 應避免白天被蚊蟲叮咬

- ① 裝設紗窗、紗門。
- ② 登革熱流行期間，睡覺時應掛蚊帳。
- ③ 應選購環境保護署登記合格之環境衛生用藥，於家庭陰暗處噴灑。
- ④ 白天室內陰暗處可使用捕蚊燈滅蚊。
- ⑤ 外出時可使用防蚊藥膏(液)。

二. 撲滅蚊子就無登革熱

- ① 清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，是防治登革熱的根本方法。
- ② 病媒蚊孳生的場所為家屋內外或家屋附近盛水之各種容器。
- ③ 將不需要的容器去掉，必須盛水的容器，至少每週要倒棄一次，以便清洗。清洗時必須用刷子將內壁用力刷洗，才能將病媒蚊的卵洗淨。

