




旅遊醫學常見疾病及用藥須知



黃熱病

- ① 傳播方式：蚊子叮咬傳播。
- ② 各類法定傳染疾病：第五類。
- ③ 感染症狀：感染後約3~6天會開始出現症狀，症狀包括發燒、冷顫、頭痛、全身肌肉痛、噁心、嘔吐等，每個人嚴重程度不一。
- ④ 預防方式：接種黃熱病疫苗、採取防蚊措施。
- ⑤ 黃熱病高風險國家：集中在非洲及拉丁美洲。



疫苗注射

- 年齡滿9個月以上者，前往高風險地區或已有疫情區域，建議接種黃熱病疫苗，且應於出國10天以前接種。接種疫苗後，90%以上的人可產生長期保護力，故不須例行追加接種。
- 參考國際資訊，黃熱病疫苗建議追加接種對象如下
 1. 前往流行地區前追加1劑：
 - A. 在懷孕期間接種過黃熱病疫苗者。
 - B. 接種過黃熱病疫苗後，接受造血幹細胞移植者。
 2. 欲前往流行地區前且距上次接種超過10年，追加1劑：
 - A. 人類免疫缺乏病毒 (human immunodeficiency virus, HIV) 感染者。
 - B. 因旅行季節、地點、活動或停留時間而有較高感染風險者。
 3. 常規性處理野生型黃熱病病毒的實驗室工作者，每10年追加1劑。

外遊做好防蚊措施 預防蚊傳疾病

出發前最少6個星期，諮詢醫生意見

穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲

如兒童前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有可能被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺

於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

如房間沒有空調設備，應使用蚊帳或防蚊網

資料來源：衛生署衛生防護中心



高雄市立小港醫院 藥學科 關心您的健康



110年8月製訂