



旅遊醫學常見疾病及用藥須知

瘧疾 - Malaria

瘧疾為第一類法定傳染病，24小時內需通報

1. 主要傳染方式：**感染瘧原蟲之雌性瘧蚊叮咬。**
2. 臨床症狀：**前驅**症狀-輕度發熱、倦怠、不舒服。
輕症發作症狀-發冷期→發熱期→發汗期。
重症症狀-腦性瘧疾、意識不清、痙攣、昏迷、神經異常....等。



瘧疾預防用藥簡介

藥品成分名	成人服用方式	禁忌症及注意事項
Apo-Mefloquine® Mefloquine 	<ul style="list-style-type: none"> • 每週一次 • 抵達高風險區前1-2週開始服用、離開後繼續服用4週 • 每次一錠250mg 	禁忌症 <ul style="list-style-type: none"> • 憂鬱症、焦慮症、精神分裂症等精神疾病患者、有痙攣或癲癇病史對藥物成分過敏者 應特別注意對象 <ul style="list-style-type: none"> • 有心律不整病史、體重小於5公斤的嬰幼兒、懷孕前3個月婦女 副作用 <ul style="list-style-type: none"> • 噁心、嘔吐、暈眩、失去平衡、頭痛、失眠、嗜睡 • 如有皮膚出疹應立即停藥並諮詢醫師 • 駕駛車輛飛機操作機械深海潛水等需細膩協調動作者應特別留意暈眩平衡失調等副作用
Malarone® Atovaquone-proquanil 	<ul style="list-style-type: none"> • 每日一次 • 抵達高風險區前1-2日開始服用、離開後繼續服用7日 • 每次一錠 	禁忌症 <ul style="list-style-type: none"> • 懷孕及哺乳中婦女、5公斤以下嬰幼兒、嚴重腎功能不全、對藥物成分過敏者 副作用 <ul style="list-style-type: none"> • 頭痛、噁心、嘔吐、胃痛、腹瀉、食慾不振、少數會出現焦慮、心悸、 • 如有皮膚出現紅疹、發癢應立刻停藥並諮詢醫師
Doxycycline® Doxycycline 	<ul style="list-style-type: none"> • 每日一次 • 抵達高風險區前1-2日開始服用、離開後繼續服用28日 • 每次一錠 	禁忌症 <ul style="list-style-type: none"> • 孕婦、8歲以下兒童、對藥物成分過敏者 應特別注意對象 <ul style="list-style-type: none"> • 哺乳中婦女、肝功能不全 副作用 <ul style="list-style-type: none"> • 皮膚光敏感性(建議加強防曬)、胃部不適、長期服用可能增加陰道念珠菌感染機率
Hydroxy-chloroquine 全球抗藥性高 已不建議使用	<ul style="list-style-type: none"> • 每週一次 • 抵達高風險區前2週開始服用、離開後繼續服用4週 • 每次二錠(400mg) 	禁忌症 <ul style="list-style-type: none"> • 孕婦、有視網膜斑病變病史、對藥物成分過敏者 應特別注意對象 <ul style="list-style-type: none"> • 哺乳婦女有卟啉紫質沉着症(porphyrria)及乾癬(psoriasis)病史者、蠶豆症患者、兒童不可長期使用 副作用 <ul style="list-style-type: none"> • 視力模糊、皮膚發疹、搔癢、噁心、下痢、頭暈 • 如有視力異常症狀(如視野出現暗點或光圈、色彩異常)應立刻停藥並就醫

瘧疾用藥注意事項

1. 藥物**效果相當**，依照病人**個別性**做選擇。
2. 藥物無法完全保護疾病發生、**防蚊為最重要的預防**。
3. 若旅遊時間**超過3個月**，不應使用藥物(因長期副作用)，**應加強防蚊與環境預防**。
4. 除非絕對必要，**孕婦、嬰兒或幼兒**應避免到瘧疾疫區。



高雄市立小港醫院

藥學科

關心您

的健康



110年8月製訂