



旅遊醫學常見疾病及用藥須知

A型肝炎

第二類傳染病

於24小時內進行通報

1. 傳染途徑:

(1) 攝入受汙染的食物或水

(2) 人與人接觸傳染

-- 與感染者間接接觸(如：照顧者更換或清理受感染者之尿布或糞便後沒有正確洗手)

-- 性接觸(包括同性間與異性間肛交及口陰交等)

(3) 血液傳染(如：靜脈藥癮者共用針頭、輸血等)

2. 主要流行地區包括亞洲、非洲與中南美洲等地區，尤以東南亞、印度、中國大陸等地區較嚴重。

3. 臨床條件(同時具有下列二項)

(1) 出現急性發作症狀：包括發燒、全身倦怠、噁心、嘔吐、腹部不舒服等

(2) 黃疸或ALT上升。

4. 檢驗條件: Anti-HAV IgM檢驗陽性。

5. 病患之家庭成員、同住者及性伴侶，經疫調懷疑有共同感染源者，應於可傳染期最後一次接觸後14天內完成第1劑公費A型肝炎疫苗接種，並請接觸者於6個月後自行前往醫療院所接受第2劑自費疫苗接種，以預防可能感染及傳播。

◆A型肝炎疫苗建議接種劑量及時程



中英文品名	劑型/劑量/接種年齡	製造廠/國別	疫苗持有許可證廠商
VAQTA 唯德不活化 A型肝炎疫苗	1. 兒童及青少年劑型 25 U/0.5 mL 1歲~未滿19歲 2. 成人劑型 50 U/1mL 19歲(含)以上	MERCK SHARP & DOHME CORP. (USA)	美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司
HAVRIX 1440/720 JUNIOR 新赫寶克	1. 兒童及青少年劑型 720 EL.U/0.5 mL 1歲~未滿19歲 2. 成人劑型 1440 EL.U/1mL 19歲(含)以上	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (Belgium)	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司
Avaxim 80U Pediatric 巴斯德A型肝炎疫苗	兒童劑型 80 U/0.5 mL 1歲~15歲(含)	SANOPI PASTEUR S.A. (France)	賽諾菲股份有限公司

※完成2劑疫苗接種(間隔6至12個月)·免疫力可維持20年以上。

症狀



發燒



全身倦怠



噁心嘔吐



黃疸或ALT上升



高雄市立
小港醫院

藥學科 關心您的健康



110年8月製訂